

診療科	外科
レジメン名称	オニバイド+5FU/I-LV
パスID	00001112
1クール	14日間
最大クール数	制限無し

備考  
オニバイド+5FU/I-LV  
※ 初回投与時にはUGT1A1\*6とUGT1A1\*28のホモ・ヘテロ接合体の有無確認を行うこと → 無い場合は70m g /m<sup>2</sup>可 → 有する場合、もしくは検査未実施の場合、オニバイド、50m g /m<sup>2</sup>で初回投与、認容性が認められる場合2クール目から70m g /m<sup>2</sup>投与可

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day
						1
1	大塚生食注TN/50mL1キット	1 本		中心静脈注射	0.1時間で	1回
2	ゲラニセトロン静注液3mgシリンジ「ザイ」 デキサート注射液6.6mg(2mL/瓶) デキサート注射液1.65mg(0.5mL/管) 大塚生食注TN/50mL1キット	1 本 1 vial 2 A 1 本		ポート用（中心静脈注射）	0.5時間で	1回
3	オバシド点滴静注43mg 生理食塩液「ヒカリ」/500mL1瓶(500mL/	70 mg/m <sup>2</sup> 1 本	77 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1.5時間で	1回
4	大塚生食注TN/50mL1キット	1 本		点滴静注	0.1時間で	1回
5	レボホリナート点滴静注用100mg「NK」 レボホリナート点滴静注用25mg「NK」 生理食塩液パック「フード」/250mL1袋(2	0 vial 0 vial 1 袋		ポート用（中心静脈注射）	2時間で	1回
6	フルオカラン注250mg「トーカ」 生理食塩液PL「フード」/20mL1管(20mL/	2400 mg/m <sup>2</sup> 0 mL	2500 mg/m <sup>2</sup>	ポート用（中心静脈注射）	46時間で	1回