

診療科	外科
レジメン名称	SOX+ビロイ(胃癌)2回目以降(外来)
パスID	00001977
1クール	21日間
最大クール数	制限無し

備考

TS-1 : 80~120mg/day p. o. day 1(夕) ~ day 15(朝)

※ビロイ投与中嘔吐/悪心があれば投与中断。15分症状持続する場合はプリンペラン1A静注またはアタラックスP25mg1A点滴後、さらに15分経過観察。回復すれば50mg/m²/hrで再開し、15分後75mg/m²/hrへ。

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day
						1
1	生理食塩液PL「ツリー」/100mL1瓶(100mL)	1本		点滴静注	5時間で	1回
2	デキサト注射液6.6mg(2ml/瓶) アロカリス点滴静注235mg ハロセトロン点滴静注パック0.75mg/50mL ホラミン注5mg デキサト注射液1.65mg(0.5ml/管)	1 vial 1 vial 1 袋 1 A 2 A		点滴静注	30分で	1回
3	ヒドロ点滴静注用100mg 生理食塩液「ツリー」/500mL1瓶(500ml)/ 大塚蒸留水/20mL1管	600 mg/m ² 1本 2 A	660 mg/m ²	点滴静注	*点滴速度 0ml/hr	1回
4	大塚生食注TN/50mL1キット	1本		点滴静注	30分で	1回
5	光糖液5%/5%500mL1瓶 エルブ ラット点滴静注液100mg	1本 130 mg/m ²	143 mg/m ²	点滴静注	2時間で	1回