

診療科	外科
レジメン名称	SOX+ビロイ(胃癌)初回(入院)
パスID	00001978
1クール	21日間
最大クール数	制限無し

備考
TS-1: 80~120mg/day p.o. day1(夕)~day15(朝) ※ビロイ投与中嘔吐/悪心があれば投与中断。15分症状持続する場合はプリンペラン1A静注またはアタラックスP25mg点滴後、さらに15分経過観察。回復すれば50mg/m ² /hrで再開し、15分後100mg/m ² /hrへ。

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day 1
1	生理食塩液PL「フー-」/100mL1瓶(100m	1本		点滴静注	5時間で	1回
2	デキスト注射液6.6mg(2ml/瓶) デキスト注射液1.65mg(0.5ml/管) アロカス点滴静注235mg パロメトロン点滴静注パツク0.75mg/50m ホラミン注5mg	1 vial 2 A 1 vial 1 袋 1 A		点滴静注	30分で	1回
3	ビロイ点滴静注用100mg テルモ生食/1L1袋(1000ml/袋) 大塚蒸留水/20mL1管	800 mg/m ² 1 袋 4 A	880 mg/m ²	点滴静注	* 点滴速度 0mL/hr	1回
4	大塚生食注TN/50mL1キット	1本		点滴静注	30分で	1回
5	光糖液5%/5%500mL1瓶 エルブラット点滴静注液100mg	1本 130 mg/m ²	143 mg/m ²	点滴静注	2時間で	1回