

診療科	呼吸器内科
レジメン名称	タルラタマブ療法 1コース目
パスID	00001998
1クール	28日間
最大クール数	1回まで

備考

Day 1・8の投与開始から24時間は必ず入院管理。サイトカイン放出症候群軽減目的でデキサート注6.6mg点滴（Day 1・8）。PVCフリールートを使用しないこと。→トップ輸液セットクリア（ポンプ用）は使用可能。

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	大塚生食注TN/50mL1キット	1本		点滴静注	15分で	1回								1回						
2	大塚生食注TN/50mL1キット デキサート注射液6.6mg(2ml/瓶)	1本 1 vial		点滴静注	15分で	1回								1回						
3	大塚生食注TN/50mL1キット	1本		点滴静注	5分で	1回								1回						
4	デキサート点滴静注用1mg 大塚蒸留水/20mL1管 生理食塩液パック「ワニ」/250mL1袋(2)	1 mg 1.3 mL 236 mL	1.1 mg	点滴静注	60分で	1回														
5	テルモ生食/1L1袋(1000ml/袋)	1袋		点滴静注	4時間で	1回														
6	デキサート点滴静注用10mg 大塚蒸留水/20mL1管 生理食塩液パック「ワニ」/250mL1袋(2)	10 mg 4.4 mL 233 mL	11 mg	点滴静注	60分で									1回						
7	テルモ生食/1L1袋(1000ml/袋)	1袋		点滴静注	4時間で									1回						
8	デキサート点滴静注用10mg 大塚蒸留水/20mL1管 生理食塩液パック「ワニ」/250mL1袋(2)	10 mg 4.4 mL 233 mL	11 mg	点滴静注	60分で															
9	テルモ生食/1L1袋(1000ml/袋)	1袋		点滴静注	4時間で															

15
1回
1回
1回