

診療科	脳神経内科
レジメン名称	エンドキサンパルス(血管炎70歳以上腎正常)
パスID	00000798
1クール	28日間
最大クール数	制限無し

備考

MPA以外の血管炎で70歳以上で血清Cre<3.4mg/dLの場合のエンドキサンパルス

☆ウロミテキサン投与量：

エンドキサン1日量の40%相当量を1回量とする。

エンドキサン投与時・4時間後・8時間後に投与。

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day
						1
1	注射用エンドキサン100mg テルモ生食/500mL1袋(500ml/袋)	10 mg/Kg 1 袋	1000 mg/m ²	点滴静注	2時間で	1回
2	生理食塩液「ヒカリ」/500ml1瓶(500ml/	1 本		点滴静注	4.4時間で	5回
3	ウロミテキサン注100mg 生理食塩液PL「ツー」/100mL1瓶(100m	0 A 1 本		点滴静注	2時間で	1回
4	ウロミテキサン注100mg 生理食塩液PL「ツー」/100mL1瓶(100m	0 A 1 本		点滴静注	2時間で	1回
5	ウロミテキサン注100mg 生理食塩液PL「ツー」/100mL1瓶(100m	0 A 1 本		点滴静注	2時間で	1回