

診療科	脳神経内科
レジメン名称	抗NMDA受容体脳炎エンドキサンパルス
パスID	00000823
1クール	28日間
最大クール数	6回まで

備考  
抗NMDA受容体脳炎2nd Line。4週あけて計6回。ウロミテキサンはシクロホスファミド1日量×40%/回×3回/日を目安に調整可。

#### レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day
						1
1	生理食塩液「ヒカリ」/500mL1瓶(500ml/1本)	1 本		点滴静注	4.4時間で	5回
2	生理食塩液PL「ツー」/100mL1瓶(100ml)デキサート注射液6.6mg(2ml/瓶) ハロセトロ静注0.75mg/2mLシリジットーワ	1 本 1 vial 1 本		点滴静注	30分で	1回
3	注射用エンドキサン100mg 生理食塩液「ヒカリ」/500mL1瓶(500ml/1本)	750 mg/m <sup>2</sup> 1 本	825 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間で	1回
4	ウロミテキサン注100mg 生理食塩液PL「ツー」/100mL1瓶(100ml)	4 A 1 本		点滴静注	2時間で	1回
5	ウロミテキサン注100mg 生理食塩液PL「ツー」/100mL1瓶(100ml)	4 A 1 本		点滴静注	2時間で	1回
6	ウロミテキサン注100mg 生理食塩液PL「ツー」/100mL1瓶(100ml)	4 A 1 本		点滴静注	2時間で	1回